

## بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستان ایران مهر تهران ۱۳۸۷

داود یادگاری نیا<sup>۱</sup>، فرهاد عباسی<sup>۲</sup>، سهیلا پیمانی<sup>۳</sup>، شراره غلامی<sup>۴</sup>، مهسا احمدزاده<sup>۴</sup>

۱. متخصص بیماری‌های عفونی، استاد مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۲. متخصص بیماری‌های عفونی، پژوهش گر مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳. کارشناس پرستاری، عضو کمیته عفونتهاي بیمارستانی
۴. پژوهش عمومی، پژوهش گر مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

\* نشانی برای مکاتبه: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری.

تلفن ۰۲۶۴۳۹۹۶۳-۸، mahsa.ahz@gmail.com

دریافت مقاله: مهر هشتاد و نه پذیرش برای چاپ: دی هشتاد و نه

### چکیده

**سابقه و هدف:** در سالهای اخیر آنتی بیوتیک‌ها نقشی حیاتی در کنترل عفونتها داشته‌اند؛ اما مقاومت باکتریایی مشکل حاد و رو به افزایشی است که سلامت جهانی را تهدید می‌کند. در این راستا تعیین فراوانی والگوهای مقاومت میکروبی جهت درمان مناسب بیماران ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارانی از بخش‌های مختلف یک بیمارستان خصوصی تهران والگوهای توزیع آن می‌باشد.

**روش کار:** ۵۰۱ نمونه حاصل از رحم، خلط، ادرار، مایع مغزی نخاعی، مایع پلور، خون، مایع سینوویال و مایع آسیت از بیماران بستری جمع آوری و کشت داده شد.

یافته‌های ۵۰۱ نمونه با کشت مثبت جمع آوری شد. از این تعداد ۲۵۲ مورد از نمونه‌ها از زنان (۴۹.۶٪) و ۲۵۶ مورد (۵۰.۴٪) از مردان بود (۴۶.۱٪) از نمونه‌ها مربوط به ادرار، ۱۳۰ مورد (۲۵.۶٪) از نمونه‌ها مربوط به خلط، ۹۳ مورد (۱۱.۳٪) از نمونه‌ها مربوط به زخم، ۳۱ مورد (۷.۵٪) از نمونه‌ها مربوط به خون، ۷ مورد (۱.۴٪) از نمونه‌ها مربوط به مایع مغزی نخاعی و ۶ مورد (در مجموع ۱.۲٪) از نمونه‌ها مربوط به مایع آسیت، سینوویوم و مایع پلور بود. ۴۹.۳٪ از نمونه‌های ای کولای به سفتیزیوکسیم، ۵۷.۱٪ به جنتامایسین، ۶۹.۵٪ به کوتیریموکسازول و ۷۱.۱٪ به سفتریاکسون مقاوم بودند. ۳۹.۷٪ و ۳۱.۸٪ از نمونه‌های سودومونا به ترتیب به جنتامایسین و آمیکاسین مقاوم بودند. مقاومت نمونه‌های کلبسیلا به سپیروفلوکسازین ۴۱.۱٪ و کوتیریموکسازول ۵۶.۷٪ بود. نمونه‌های با کشت مثبت استاف اورئوس ۴۰.۴٪ به ونکومایسین مقاوم بود. مقاومت نمونه‌های استاف اورئوس به سفالوتین (سفالوسپورین نسل اول) در حد ۷۱٪ بود. این در حالی است که استاف های کواگولاز منفی ۹٪ به ونکومایسین و ۴۰٪ به سفالوتین مقاوم بود.

**نتیجه گیری:** با توجه به مقاومت بالای آسینتوباکتر، کلبسیلا و سودومونا به سفالوسپورین های نسل اول (سفالوتین) و نسل سوم (سفتی زوکسیم و سفتریاکسون) استفاده از آنها جهت درمان عفونتهاي بیمارستانی چندان مفید نمی‌باشد. مقاومت ای کولای به آمینوگلیکوزیدها و کینولونها در حال افزایش است که باید نحوه استفاده ای آنتی بیوتیکی و دوز درمانی و ترکیب درمانی آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که مقاومت سودومونا با آمینوگلیکوزیدها در این مطالعه کمتر از ۵۰٪ گزارش شده است.

### واژگان کلیدی: عفونتهاي بیمارستانی، مقاومت باکتریایی، آنتی بیوتیک

جهت انتخاب آنتی بیوتیکهای مناسب و نظارت بر ایدمی‌های مقاومت آنتی بیوتیکی منطقه برای پزشکان فراهم می‌شود<sup>(۵)</sup>. در این تحقیق رشد سوشهای متفاوت در نمونه‌های مختلف بیمارستانی و بررسی آنتی بیوگرام آنها انجام شده است تا میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سوشهای متفاوت در نمونه‌های زخم، ادرار، خون، خلط و مایع مغزی نخاعی بررسی شود.

**مقدمه**  
به نظر می‌رسد جامعه پزشکی در سراسر دنیا در حل مشکل تهدید کننده افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی ناتوان بوده است<sup>(۱-۳)</sup>. نشان داده شده است اند که یکی از مهمترین علل این امر استفاده نادرست از آنتی بیوتیکها است<sup>(۴)</sup>. با در دسترس داشتن اطلاعات در این زمینه، کمکی در

جنتامايسين، ۶۹.۵٪ به کوتريموکسازول و ۷۱.۱٪ به سفترياکسون مقاوم بودند)  
جدول ۲

جدول ۱: توزيع ميكروارگانيسم ها جدا شده از نمونه هاي زخم در  
بيمارستان ايران مهر تهران. ۱۳۸۷

نوع ارگانيسيم	تعداد	درصد
ای کولاي	۳۱	%۳۳.۳
کلبيسلا	۱۴	%۱۵.۱
سودومونا	۸	%۸.۶
استاف اورئوس	۱۸	%۲۰.۵
استاف کوگولاز منفي	۱۸	%۱۹.۳
پنوموكوك	۱	%۱.۱
انتروباكتر	۱	%۱.۱
آسينتوباكتر	۱	%۱.۱
کل	۹۳	%۱۰۰

جدول ۲: توزيع ميكروارگانيسم ها جدا براساس مقاومت آنتی بيوتيكي آنها. بيمارستان ايران مهر تهران. ۱۳۸۷

آنتمي بيوتيك	ای کولاي	کلبيسلا	سودومونا	استاف اورئوس	استاف اپيدرميديس
جنتامايسين	۵۷.۸	۵۶.۷	۳۹.۷	—	—
آميکاسين	۲۲.۱	۴۹	۳۸.۸	۸۷.۵	۱۰۰
کوتريموکسازول	۶۹.۵	۵۶.۷	۶۷.۷	—	۲۵
سيپروفلوکساسين	۵۶.۷	۴۸.۱	۶۰.۳	۷۱.۴	۵۰
ايمپين	—	—	—	—	—
ونکومايسين	—	—	—	۴.۴	۹.۱
سفترياکسون	۷۱.۱	۷۱.۱	۱۰۰	—	—
سفتي زوكسيم	۴۹.۵	۴۹.۳	۹۴	—	—
سفتاريديم	—	—	—	—	—
سفپيم	—	—	—	—	—
سفالوتيين	—	—	—	۷۱	۴۰

۲۱.۱٪ کلبيسلا، ۲۱.۱٪ اى کولاي، ۳۹.۵٪ استاف اورئوس و ۲۶٪ سودومونا می باشد. نمونه های CSF ما در این مطالعه اندک بوده که از میان ۷ نمونه موجود ۲ نمونه اى کولاي رشد کرده است. مقاومت اى کولاي در مطالعات گذشته رو به افزایش و بيشتر مربوط به مصرف آمينوگلیکوزیدها بوده است (۱۰ و ۱۱).

### نتيجه گيري

با توجه به مقاومت بالاي آسينتوباكتر، کلبيسلا و سودومونا به سفالوسيپورين هاي نسل اول (سفالوتيين) و نسل سوم (سفتي زوكسيم و سفترياکسون) استفاده از آنها در جهت درمان عفونتهای بیمارستانی مثمر ثمر نمی باشد. مقاومت اى کولاي به آمينوگلیکوزیدها و کینولونها در حال افزایش است که باید نحوه استفاده آنتی بيوتيكي و دوز درمانی و ترکیب درمانی آن بيشتر مورد نظر قرار گيرد. اين درحالی است که مقاومت سودومونا با آمينوگلیکوزیدها در اين مطالعه كمتر از ۵٪ گزارش شده که خود نکته اي حائز اهميت در درمان عفونتهای بیمارستانی می باشد.

### روش کار

اين مطالعه مقطعی بوده و در طول سال ۱۳۸۷ در بیمارستان ايران مهر تهران انجام شد. ۵۰۸ نمونه حاصل از زخم، خلط، ادرار، مایع مغزی نخاعی، مایع پلور، خون، مایع سینوپال و مایع آسیت از تمامی بخشهاي بیمارستان جمع آوري شد. نمونه در محیط کشت blood agar کشت داده شد و نتایج آنتی بیوگرام آنها به روش انتشار بر روی دیسک انجام شد.

### يافته ها

در طول سال ۱۳۸۷ در مجموع ۵۰۸ نمونه با کشت مثبت جمع آوري شد که از اين تعداد ۲۵۲ مورد از نمونه ها مربوط به زنان (۴۹.۶٪)، ۲۵۶ مورد (۴۵.۰٪) مربوط به مردان بود. ميانگين سنی بیماران با نمونه هایی با کشت مثبت ۶۱ سال بود. ۲۳۴ مورد (۴۶.۱٪) از نمونه ها مربوط به ادرار، ۱۳۰ مورد (۲۵.۶٪) از نمونه ها مربوط به خلط، ۹۳ مورد (۱۸.۳٪) از نمونه ها مربوط به زخم، ۳۸ مورد (۷.۵٪) از نمونه ها مربوط به خون، ۷ مورد (۱.۴٪) از نمونه ها مربوط به مایع مغزی نخاعی و ۶ مورد (در مجموع ۱.۲٪) از نمونه ها مربوط به مایع آسیت، سینوپال و مایع پلور بود. توزيع ميكروارگانيسم های بدست آمده از نمونه هاي زخم در جدول ۱ نشان داده شده است. اى کولاي به سفتريزوکسيم، ۷۵.۸٪ از نمونه های آنها به سفتريزوکسيم، ۴۹.۳٪ از نمونه های آنها به کولاي به سفتريزوکسيم،

### بحث

استفاده نادرست و بيش از حد از آنتی بيوتيكها سبب ايجاد باكتيرياي مقاوم به چندين دارو و رشد سريع آنها شده است (۶). در حال حاضر در حدود ۷۰ درصد از باكتيرياي مولد عفونتها حاصل به يكی از آنتی بيوتيكهاي معمول مقاوم استند (۷). در اين مطالعه در نمونه های براگره از زخم ۳۳٪ اى کولاي و ۸.۶٪ سودومونا رشد کرد. چنین رشد بالايی از اشرشيا کولي با مطالعه compt و همکارانش، که بيشترین باكتري جدا شده از محل عفونت زخم را اى کولاي (۲۱.۸٪) و پس از آن سودوموناس (۹.۲٪) گزارش کرده اند، هم خوانی دارد (۸). با توجه به توزيع پايان سودوموناس در نمونه های زخم می توان به مصرف درست آنتی بيوتيك و ترکيب صحيح آنتی بيوتيك ها در اين نمونه ها پي بر. توزيع ميكرو ارگانيسم ها در نمونه های ادرار بصورت ۷۰٪ اى کولاي، ۱۴.۵٪ کلبيسلا و ۹.۸٪ سودومونا می باشد. توزيع بالاي اى کولاي در مطالعه L Pisani و همکارانش بر روی مقاومت باكتيرياي در نمونه های ادرار نيز ديده ميشد. در اين بررسی همچنین نشان داده شد که تفاوت قابل ملاحظه اى در استفاده از داروهای معمول بر روی اين عفونت وجود ندارد (۹). توزيع نمونه های خون آلوده شده به ميكروارگانيسم ها بصورت

## REFERENCES

---

- 1.Jaroslov Timko. Development of bacterial resistance in central Military hospital Rezumberok, Slovakia.Biologia,Bratislava, 2004;59:367-374.
- 2.Flournoy D.J,Reinert R.L,Bell Dixon et al.Increasing antimicrobial resistance in gram negative bacilli isolated from patients in intensive care units.Am. J. Infect. Control 2000;28:244-250.
- 3.Ibrahim E.,Sherman G.,Ward S.et al.The influence of infadequate antimicrobial treatment of bloodstream infections on patient outcomes in the ICU setting.Chest 118:146-155.
4. KOLLEF, M. H., SHERMAN, G.,WARD, S. & FRASER, V. J. 1999. Inadequate antimicrobial treatment of infections. A risk factor for hospital mortality among critically ill patients. Chest 115: 462-474.
- 5.Livermore, D.M. ,Macgowan,A.P.Survillance of antimicrobial resistance.Br.Med.1998;317:614-615.
- 6.Huycke,M.M.,Sahm D,et al.Multiple drug resistance enterococci .Emerg.Infect.Dis1998;4:239-249.
- 7.Kenneth Todar.Bacterial resistance to Antibiotics.Sience Magezine of microbiology.2004;Todar's textbook of microbiology1304-1421.
- 8.Compte DV,Mohar A,Sandoval S,DE La Rosa M,Gordillo P.Surgical site infections at the national cancer institute in Mexico:A case control study.Am J Infect Control 2000;28:14-20.
9. Pisani L,Bordonaro P,Nicoletti P,LamannaA.Frequency of isolation and drug resistance of bacterial strains from urine samples tested in the Bacteriology and Virology Laboratory of the U.S.L. 10/D in Florence.PubMed1986;22(1):21-36.
- 10.Meng J,Zhao S,Doyle MP,Joseph SW.Antibiotic resistance of Escherichia coli O157:H7 and O157:NM isolated from animals,food,and humans.University of Maryland.JFood Port1998;61(11):1511-4.
- 11.Susanne L,Raum E,Marre R,Baum H.Clustering of antibiotic resistance of Ecoli in couples.BMC infectious diseases2006;6:119.